

ASCATENE® Comprimés



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Un comprimé de 692 mg contient :
Substances actives :
Niclosamide 400 mg
Pyrantel (sf de tartrate) 28,94 mg

Forme pharmaceutique:

Comprimés.

Espèce cibles:

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Affections à parasites sensibles au pyrantel et au niclosamide.

Chez les chiens et les chats, traitement des infestations par les parasites suivants :

- nématodes gastro-intestinaux :

Toxocara canis et cati

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

- cestodes :

Taenia spp

Dipylidium caninum

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Ne pas administrer un vermifuge à base de pipérazine à moins de 24 heures d'intervalle car les actions se neutralisent.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Dans de très rares cas, le traitement peut induire des vomissements, des troubles neurologiques (ataxie, tremblement, prostration...) ainsi que des troubles systémiques (léthargie, dépression, faiblesse, apathie...).

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de allaitement:

L'innocuité de la spécialité n'a pas été étudiée chez l'espèce cible.

Les principes actifs étant peu absorbés au niveau intestinal, l'utilisation de la spécialité en cas de grossesse ou de lactation ne devrait pas poser de problème particulier.

Interactions médicamenteuses et autres:

Ne pas associer avec des sels de pipérazine (inactivation).

Posologie:

Administrer en une seule prise.

100 mg de niclosamide et 7,23 mg de pyrantel par kg de poids corporel, par voie orale en une administration, correspondant à 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Voir la rubrique "Effets indésirables".

Temps d'attente:

Sans objet.

Propriétés pharmacodynamiques:

Le niclosamide est un anthelminthique cestodicide de la famille du salicylanilide. Il intervient dans le métabolisme hydrocarboné du parasite en bloquant le cycle de Krebs, ce qui se traduit par une accumulation d'acide lactique permettant la lyse des téguments par les enzymes digestives. Il présente une activité sur la plupart des ténias des carnivores.

Le pyrantel (sous forme de tartrate), dérivé de la tétrahydropyrimidine, est actif contre les nématodes du chien et du chat : *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*, *toxocara cati* et *Toxascaris leonina*.

Caractéristiques pharmacocinétiques:

Non documentées.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

4 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Aucune.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

Laboratoires AUVEX
3 rue André Citroën

ZAC Champ Lamet
63430 PONT-DU-CHÂTEAU

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/2098774 3/1991 - 03/05/1991

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Exonéré de la liste II.

Classification ATC Vet:

QP52AG03

Boe de 1 blister de 10 comprim
GTIN : 03661729236063

Laboratoires AUVEX

Gamme BIOCANINA
3, rue André Citroën
Z.A.C. Cham-Lamet
63430 Pont-du-Chateau
Tél : 04 63 66 33 90
contact@biocanina.fr

