

# BOVIFERM® PLUS<sup>SD</sup>

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour veaux.

Poudre pour solution buvable.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :

Dextrose, lactosérum en poudre partiellement délactosé, chlorure de sodium, chlorure de potassium, flocons de banane, farine de riz, camomille, pectine, anis, fenouil, chlorure de calcium, chlorure de magnésium.

Constituants analytiques :

Matières protéiques brutes ..... 4 %

Matières grasses brutes ..... 0,5 %

Sodium ..... 4,4 %

Cellulose brute ..... 1,4 %

Potassium ..... 3 %

Cendres brutes ..... 21 %

Chlorures ..... 3,8 %

Liste des additifs :

Additifs par kg :

Vitamines :

Vitamine A (E672) ..... 175 000 UI

Vitamine E (3a700, acétate d'alphatocophéryle totalement racémique) ..... 440 mg

Additif zootechnique :

*Enterococcus faecium* DSM 10663 NCIMB 10415 (E1707) (Oralin) ..... 1,75 x 10<sup>10</sup> UFC

Additifs technologiques :

Propionate de sodium (E281), gomme de guar (E412), bentonite montmorillonite (1m558i) : 30 g

Utilisation:

Chez les veaux :

stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau en cas de risque de troubles digestifs (diarrhées) pendant et après ceux-ci.

Pratique et économique, la formule "5 en 1" :

- apport d'électrolytes : favorise la réhydratation.

- apport de dextrose : redonne de l'énergie.

- apport de propionate de sodium : apporte des substances tampon.

- apport de montmorillonite : participe à la protection de la muqueuse intestinale.

- apport de bactéries lactiques : ré-ensemence et stabilise la flore intestinale.

Mode d'emploi:

Voie orale, après dilution dans l'eau.

- En élevage laitier

Verser 1 sachet (115 g) dans 2 litres d'eau à 40°C, 2 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. Possibilité d'ajouter 0,5 litres à 4 litres de lait ou de lactoreplaceur par buvée selon les besoins du veau.

- En élevage allaitant

Verser 1/2 sachet dans 1 litre d'eau à 40°C, 3 à 4 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. Laisser le veau téter sous la mère.

Durée maximale d'utilisation : 7 jours.

Précautions d'emploi:

Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

Conservation au frais, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

BOVIFERM® PLUS<sup>SID</sup> contient des bactéries lactiques revivifiables ; la température du mélange ne doit pas excéder 50°C.

A conserver au frais et au sec.

---

Boe de 24 sachets de 115 g

GTIN : 03401176184537

---

Boe de 80 sachets de 115 g

GTIN : 03401177991301

---

Laboratoires BIOVE

3, rue de Lorraine B.P. 45

62150 ARQUES

Tél : 03.21.98.21.21.

Fax : 03.21.88.51.95

biove@labobiove.com



*laboratoires  
biové*