

BOVIKALC®

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour bovins.

Objectif nutritionnel particulier reconnu : réduction du risque de fièvre vitulaire.

Composition par ordre de poids décroissant:

Bolus.

Composition :

Chlorure de calcium, sulfate de calcium, mono et diglycérides d'acides gras estérifiés avec de l'acide acétique.

Constituants analytiques :

Calcium 21,9 %

Humidité 32,0 %

Chaque bolus contient 43 g de calcium, dont 71 % sous forme de chlorure de calcium et 29 % sous forme de sulfate de calcium. BOVIKALC® ne contient pas de sodium, phosphore ou magnésium.

Liste des additifs :

L'information peut être obtenue auprès du fournisseur.

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

BOVIKALC® assure un apport élevé en calcium pour la réduction du risque de fièvre vitulaire chez les vaches laitières autour du vêlage.

BOVIKALC® contient du chlorure de calcium, qui se dissout rapidement dans le rumen, et du sulfate de calcium, qui se dissout seulement après avoir été dégradé par la microflore du rumen.

Utilisation:

Chez les vaches laitières prédisposées au risque de fièvre vitulaire, particulièrement chez les vaches laitières hautes productrices et les vaches ayant des antécédents de fièvre vitulaire.

Mode d'emploi:

BOVIKALC® s'administre par voie orale, au moyen de l'applicateur prévu à cet effet.

- Pour les vaches à risque de fièvre de lait, donner 4 bolus :

- . 1^{er} bolus aux premiers signes de vêlage ;
- . 2^e bolus immédiatement après le vêlage ;
- . 3^e bolus 12 à 15 heures après le vêlage ;
- . 4^e bolus 24 à 30 heures après le vêlage.

- Pour les vaches en accompagnement du traitement de la fièvre de lait par injection de calcium, donner 2 bolus :

- . 1^{er} bolus 2 à 3 heures après l'injection intraveineuse de calcium ;
- . 2^e bolus 12 à 15 heures plus tard.

La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation.

Précautions d'emploi:

BOVIKALC® ne doit pas être administré à des vaches présentant des signes cliniques de fièvre vitulaire car le réflexe de déglutition peut être perturbé.

Ne pas administrer BOVIKALC® aux vaches couchées.

Avant utilisation, veiller à ce que le bolus soit en parfait état et que son film protecteur soit intact.

Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 30°C. Maintenir chaque bolus dans son emballage plastique jusqu'au moment de l'administration car il est sensible à l'humidité et à l'air.

Autres obligations liées la catégorie:

Fabricant :
BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK A/S
Strødamvej 52
DK-2100 København Ø
N° denregistrement : 208-R854833

Boe de 4 bolus
GTIN : 04028691517504

BOEHRINGER INGELHEIM France

Division Santé Animale
12, rue André Huet
51100 REIMS
Tél : 03.26.50.47.50
Fax : 03.26.50.47.43

infoveto@rei.boehringer-ingelheim.comwww.boehringer-ingelheim.fr

