

CALFORM®

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment diététique.

Chez la vache laitière, réduction du risque de fièvre vitulaire avec une teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à haute disponibilité.

Composition par ordre de poids décroissant:

Chlorure de magnésium
Chlorure de sodium

Liste des additifs :

Formiate de calcium 486 000 mg/l

Utilisation:

Chez la vache laitière :
- réduction du risque de fièvre vitulaire avec une teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à haute disponibilité.

Mode d'emploi:

Administrer par voie orale.
1 flacon = 1 dose unitaire/vache.

- Vêlage et préparation à la lactation : 4 flacons.

Administrer 1 flacon de CALFORM® :

- . la veille du vêlage ;
- . au vêlage ;
- . à 12 et à 24 heures après le vêlage.

- En complément d'une thérapeutique calcique : 2 flacons.

Administrer 1 flacon de CALFORM® :

- . au vêlage ;
- . à 12 et à 24 heures après le vêlage.

Veiller à l'équilibre de la ration journalière.

Précautions d'emploi:

Agiter avant toute utilisation.
Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

Autres obligations liées la catégorie:

Conserver à l'abri du gel.

Boe de 4 flacons de 350 ml
GTIN : 03401170783996

BAYER HEALTHCARE

DIVISION ANIMAL HEALTH
13, rue Jean Jaurès
92807 PUTEAUX CEDEX
Tél : 01.49.06.56.00
Fax : 01.49.06.58.48



Bayer HealthCare
Animal Health