

CALFORM® Eco

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment diététique.

Chez la vache laitière, réduction du risque de fièvre vitulaire, avec une teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à haute disponibilité.

Composition par ordre de poids décroissant:

Propylène glycol 8,4 %
Calcium diphosphate 2,7 %
Chlorure de magnésium 1,5 %

Liste des additifs :

Formiate de calcium 437 000 mg/l

Utilisation:

Chez la vache laitière :

- réduction du risque de fièvre vitulaire, avec une teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à haute disponibilité.

Mode d'emploi:

Administrer par voie orale.

350 ml = 1 dose unitaire/vache.

Remplir une seringue doseuse ou un flacon à raison de 350 ml.

- Vêlage et préparation à la lactation, 4 x 350 ml :

- . 1 flacon la veille du vêlage ;
- . 1 flacon au vêlage ;
- . 1 flacon 12 heures après le vêlage ;
- . 1 flacon 24 heures après le vêlage.

- En complément d'une thérapeutique calcique, 2 x 350 ml :

- . 1 flacon 12 heures après la thérapeutique calcique au vêlage ;
- . 1 flacon 24 heures après la thérapeutique calcique au vêlage.

Précautions d'emploi:

Agiter vigoureusement avant emploi.

L'administration à des animaux couchés augmente le risque de fausses déglutitions.

La consultation d'un vétérinaire est recommandée avant utilisation.

Autres obligations liées la catégorie:

Stocker entre +10°C et +25°C à l'abri de la lumière et du gel.

Tenir hors de portée des enfants.

Bidon de 3 litres

GTIN : 03401143380610

BAYER HEALTHCARE

DIVISION ANIMAL HEALTH

13, rue Jean Jaurès

92807 PUTEAUX CEDEX

Tél : 01.49.06.56.00

Fax : 01.49.06.58.48

