

## FICOSYL® GA buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Un ml contient :

*Causticum* ..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH

*Nitricum acidum* ..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH

*Calcarea ostreica* ..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH

*Lycopodium clavatum* ..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH

*Thuya occidentalis* ..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH

Excipient :

Ethanol 15 % (V/V) QSP ..... 1 ml

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Bovins, ovins, caprins, équins et les porcins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins et les porcins :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé en présence de verrues.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Sans objet.

Autres précautions:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament

homéopathique est traditionnellement utilisé pendant le gestation et la lactation.

**Interactions médicamenteuses et autres:**

Non connues.

**Posologie:**

5 ml tous les 3 jours dans l'ordre des dilutions croissantes.

Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans leau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

**voie d'administration:**

Voie orale.

**Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):**

Non connu.

**Temps d'attente:**

Zéro jour.

**Propriétés pharmacologiques:**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

**Incompatibilités:**

Non connues.

**Durée de conservation:**

5 ans.

**Précautions particulières de conservation selon pertinence:**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:**

FR/V/5482835 7/2012 - 22/06/2012

**Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:**

Sans objet.

**Laboratoires BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE  
Tél. : 04.78.45.61.00  
Fax. : 04.78.45.61.02  
dept-veterinaire@boiron.fr  
www.boiron.fr

