

IPALIGO® Veau

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire pour veaux délevage sous alimentation lactée.

Pâte orale.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :

Glycérine, Petite pervenche plante (*Vinca Minor* L), Inuline de chicorée, Maltodextrine, Levure de bière.

Constituants analytiques :

Humidité 70 %

Cendres brutes 5,5 %

Protéines brutes 4 %

Matières grasses brutes 2,5 %

Cellulose brute 1 %

Sodium 0,4 %

Liste des additifs :

Additifs par seringue de 14 g

- Composés doligo-éléments :

Fer sous forme de chélate ferreux dacides aminés hydraté (E1) 109 mg (7 800 mg/kg)

Zinc sous forme de chélate de zinc et de glycine, hydraté (3b607) 39 mg (2 800 mg/kg)

Cuivre sous forme de chlorure cuivrique dihydraté (E4) 14 mg (1 000 mg/kg)

Iode sous forme d'iodure de potassium (3b201) 5 mg (360 mg/kg)

Sélénium sous forme de sélénite de sodium (E8) 0,3 mg (21 mg/kg)

- Vitamines et provitamines :

Vitamine A (3a672a) 24 990 UI (1 785 000 UI/kg)

Vitamine D3 (E671) 2 800 UI (200 000 UI/kg)

Vitamine E / Acétate d'*alpha*-tocophèryle totalement racémique (3a700) 300 UI (21 500 UI/kg)

Vitamine C (3a300) 100 mg (7 200 mg/kg)

Chlorure de choline (3a890) 10,7 mg (770 mg/kg)

Bêta-carotène (3a160(a)) 0,98 (70 mg/kg)

- Substances aromatiques :

Glycine 74,2 mg (5 300 mg/kg)

Extrait Acérola 26 mg (1 850 mg/kg)

Utilisation:

Chez les jeunes veaux d'élevage sous alimentation lactée : IPALIGO® Veau est particulièrement étudié pour couvrir les besoins en oligo-éléments, vitamines et acides aminés essentiels.

Mode d'emploi:

Voie orale.

Distribuer dans la bouche ou dans l'aliment un tube injecteur de 14 g par veau, le plus tôt possible après la naissance. A renouveler 3 semaines plus tard si nécessaire.

Précautions d'emploi:

Ne pas utiliser cet aliment pour une autre espèce.

A conserver dans un endroit propre, frais et à l'abri de la lumière.

Autres obligations liées la catégorie:

Ce produit contient des oligo-éléments et des vitamines pour lesquels des seuils maximaux ont été définis ; pour cette raison, la dose quotidienne ne devra pas dépasser 16g/veau/jour.

16 seringues de 14 g
GTIN : 03605870085057

48 seringues de 14 g
GTIN : 03605877338705

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

70204 LURE CEDEX
Direction France
31, rue des Jeûneurs
75002 PARIS
Tél : 01.55.33.50.25
Fax : 01.47.70.42.05
www.vetoquinol.fr

Vétoquinol
 *Signe de Passion*