PVB® Drainage GA



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Taraxacum dens leonis 3 DH Chelidonium majus 5 CH Carduus marianus 3 CH Cynara scolymus 3 DH Hydrastis canadensis 3 CH China 3 DH Solidago virga aurea 3 CH

Excipient:

Ethanol 15 % (v/v) QSP 1 ml

Berberis vulgaris 3 CH aa.

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé pour favoriser le métabolisme digestif.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Sans objet.

Autres précautions:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lacation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.
Posologie:
5 ml 1 à 2 fois par jour pendant 3 semaines.
Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 ml par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.
voie d'administration: Voie orale.
Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):
Non connu.
Temps d'attente:
Zéro jour.
Propriétés pharmacologiques:
Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.
Incompatibilités:
Non connues.
Durée de conservation:
5 ans.
Précautions particulières de conservation selon pertinence:
Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.
Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:
BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 MESSIMY FRANCE
Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:
FR/V/2245672412012 - 15/06/2012
Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:
Sans objet.

Flacon de 1 litre avec bouchon doseur GTIN: 03352712006779

Laboratoires BOIRON

2 avenue de lOuest Lyonnais 69510 MESSIMY FRANCE

Tél.: 04.78.45.61.00 Fax.: 04.78.45.61.02 dept-veterinaire@boiron.fr



