

Date de création : 06-10-2021

Date de mise à jour : 26-02-2018

## Informations produit

### Type et catégorie d'aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu

Aliment complémentaire pour les chiens et les chats.

Poudre en gélule.

### Utilisation

Chez les chiens et chats : administrer à des chiens et des chats confrontés à une situation inhabituelle ou avant des situations telles que :

- modifications de l'environnement ;
- rester seul ;
- Nouvelles personnes ;
- Nouveau compagnon ;
- Période de lactation ;
- Sevrage ;
- Voyage ;
- Feux d'artifices ;
- Toute autre modification dans les habitudes de l'animal.

ZYLKENE® ne se substitue pas à une alimentation équilibrée.

Aux doses journalières recommandées, aucun effet indésirable n'a été associé à l'emploi de ce produit.

### Mode d'emploi

Voie orale.

La dose journalière recommandée doit être administrée en une seule prise. La gélule peut être ouverte et la poudre mélangée à la nourriture ou à une friandise.

	<b>Zylkène® 75 mg</b>	<b>Zylkène® 225 mg</b>	<b>Zylkène® 450 mg</b>
Chiens et chats < 5 kg	1 gélule par jour		
Chiens et chats 5-10 kg	2 gélules par jour		
Chiens 10-20 kg		1 gélule par jour	
Chiens 20-40 kg		2 gélules par jour	1 gélule par jour
Chiens > 40 kg			2 gélules par jour

### Durée d'utilisation

- Court terme : administrer de 1 à 2 jours avant l'événement prévu ou la modification de l'environnement. Pour certains animaux, il peut être nécessaire d'administrer ZYLKENE® plus précocement (5-7 jours avant).
- Long terme : 1 à 2 mois.

Laisser en permanence libre accès à l'eau.

Produit réservé à l'alimentation animale.

### Précautions d'emploi

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver dans un endroit sec et à une température inférieure à 25°C. Ne pas réfrigérer.

### Composition par ordre de poids décroissant

- ZYLKENE® 75 mg

Maltodextrine, caséine (hydrolysate trypsique de caséine bovine), stéarate de magnésium.

- ZYLKENE® 225 mg

Caséine (hydrolysate trypsique de caséine bovine), maltodextrine, stéarate de magnésium.

- ZYLKENE® 450 mg

Caséine (hydrolysate trypsique de caséine bovine), stéarate de magnésium.

Constituants analytiques :	Zylkène® 75 mg	Zylkène® 225 mg	Zylkène® 450 mg
Protéines brutes	40,2 %	72,9%	79,9 %
Cendres brutes	4,1 %	11,1 %	11,2 %
Humidité	7,5 %	8,4 %	6,9 %
Matières grasses	3,1 %	2,2 %	3 %
Cellulose brute	1 %	0 %	0 %
Sucres totaux	13,4 %	3 %	1%
Sodium	1,23 %	4,24 %	3,89 %
Phosphore	0,36 %	0,85 %	1,17 %
Magnésium	0,11 %	0,065 %	0,11 %
Calcium	0,049 %	0,069 %	0,097%
Potassium	0,020 %	0,017 %	0,062 %
Cuivre	0 %	0 %	0 %

### Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit

Poudre en gélule.

## Présentations

### Présentation et quantité

ZYLKENE® 75 mg : 10 blisters de 10 gélules

Code GTIN : 3605874332508

ZYLKENE® 75 mg : 30 gélules

Code GTIN : 3605874332515

ZYLKENE® 225 mg : 10 blisters de 10 gélules

Code GTIN : 3605874332461

ZYLKENE® 225 mg : 30 gélules

Code GTIN : 3605874332478

ZYLKENE® 450 mg : 10 blisters de 10 gélules

Code GTIN : 3605874332485

ZYLKENE® 450 mg : 30 gélules

Code GTIN : 3605874332492

### Laboratoire



Laboratoire VETOQUINOL S.A.

70204 LURE CEDEX

Direction France

31, rue des Jeûneurs

75002 PARIS

Tél : 01.55.33.50.25

Fax : 01.47.70.42.05

<http://www.vetoquinol.fr>