

NOUVELLE FORMULE

VarroMed® est le premier médicament pour les abeilles, agréé par la Commission Européenne et autorisé dans tous les pays de l'Union Européenne.


Ce produit innovant est disponible dans une bouteille de 555 ml, avec un embout d'application intégré et une échelle de graduation pour un dosage facile et pratique.

VarroMed® est un produit prêt à l'emploi, élaboré uniquement avec des substances naturelles, à base d'une combinaison de deux principes actifs : l'acide formique et l'acide oxalique dihydraté. Le délai d'attente après application est de 0 jours et il est utilisable en apiculture biologique.

VarroMed® est indiqué pour le traitement de la varroase sur les colonies d'abeilles au printemps, en fin d'été/automne et en hiver - avec ou sans couvain.

Le produit est spécialement conçu pour les abeilles, prêt à l'emploi et rapide à appliquer.


VarroMed® est disponible sans ordonnance dans tous les pays de l'UE.



AVANTAGES



LE PREMIER TRAITEMENT POUR 3 SAISONS



PRÊT À L'EMPLOI ET FACILE À UTILISER



INDEPENDAMMENT DU TEMPS ET DE LA TEMPERATURE



UTILISABLE EN APICULTURE BIOLOGIQUE

VARROMED®
5 mg/ml + 44 mg/ml



BEEVITAL FRANCE

Contact: Daniela Hölzle
Tel : 33 (0) 6 12 21 55 23
daniela@beevital.com
www.beevital.com

**POUR ACQUÉRIR
VARROMED®,
CONTACTEZ
VOTRE PHARMACIEN,
VÉTÉRIINAIRE OU
GDSA**

20180209 VM Flyer FRA v05


VarroMed® est un médicament vétérinaire utilisé en dispersion pour ruche d'abeilles. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire. En cas de persistance des symptômes consultez votre vétérinaire. ESPECE CIBLE : Abeilles. INDICATIONS : Traitement de la varroase causée par Varroa destructor dans les colonies d'abeilles avec ou sans couvain. CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser durant la miellée. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)* : Ce médicament vétérinaire est irritant pour la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact cutané accidentel, laver immédiatement les zones affectées à l'eau courante. En cas de contact accidentel avec un oeil ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante propre pendant 10 minutes. Les enfants ne doivent pas entrer en contact avec ce médicament vétérinaire. Une ingestion accidentelle peut provoquer des effets indésirables. Un équipement de protection consistant en des vêtements de protection, des gants résistants aux acides et des lunettes doit être porté lors de la manipulation du médicament vétérinaire. Les vêtements fortement contaminés doivent être retirés dès que possible et lavés avant d'être réutilisés. Les personnes présentant une sensibilité connue à l'acide formique ou à l'acide oxalique doivent administrer le médicament vétérinaire avec précaution. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. *Pour une information complète, veuillez consulter la notice disponible avec le médicament vétérinaire, soit sur le site de l'EMA, soit sur demande auprès du BEEVITAL France au 06 12 21 55 23. TEMPS D'ATTENTE : Miel : Zéro jour. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : BEEVITAL GmbH, Wiesenbergstrasse 19, 5164 Seeham, Autriche. Numéro AMM : EU/2/16/203 Numéro d'autorisation de la publicité : AP 2018/593 Exploitant : BEEVITAL GmbH, Handelsstr. 6, 5162 Obertrum, Autriche. Tél. : +43 6219 20645 VarroMed® est disponible sans prescription médicale. Usage vétérinaire.



VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml

LE PREMIER TRAITEMENT
POUR 3 SAISONS




PROTECTING YOUR BEES
www.beevital.com

COMMENT UTILISER

VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml




Graduation pratique pour un dosage facile

QUAND UTILISER


VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml




1. Après-midi/soir


2. Dose adaptée à la force de chaque colonie



	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
	15 ml	15-30 ml	30-45 ml	45 ml




3. Agiter avant emploi.



4. Appliquer entre les cadres, sur les abeilles.



5. Après 6 jours, comptez les acariens morts.





6. Si nécessaire, répéter le traitement.

VarroMed® est indiqué pour le traitement au printemps, en fin d'été/automne et en hiver - utilisable avec ou sans couvain pour une régulation optimale du varroa. Le traitement du printemps est particulièrement important pour contenir la prolifération du varroa très tôt dans la saison.

En Europe, VarroMed® a été largement expérimenté et étudié dans des conditions climatiques diverses. L'efficacité de VarroMed a été vérifiée scientifiquement, sur le terrain, quelles que soient les conditions météo.

PRINTEMPS





1X OU 3X APPLICATIONS



	<10	✓
	>10	+2

FIN D'ÉTÉ/AUTOMNE:


3X - 5X APPLICATIONS



	<90	✓	<150	✓
	>90	+1-2	>150	+1-2

HIVER:

1X APPLICATION



PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER